

Suppléments nutritifs oraux (SNO)

	Resource® Protein	Fortimel® Extra	Fortimel® Compact Protéin	FortiFit® Energy plus	Resource® Fruit
	Nestlé 200 ml	Nutricia 200 ml	Nutricia 125 ml	Nutricia 200 ml	Nestlé 200 ml
Particularités	Meilleure tolérance glycémique (proportion protéines vs glucides)	HyperCalorique	Compact	HyperCalorique Riche en AAE dont leucine	Normo-protéiné Sans lipides Type jus de fruit
Energie (kcal)	250	320	300	302	300
Protéines (g)	19	20	18	21 dont 3g leucine	8
Glucides (g)	28	31	31	30	66
Lipides (g)	7	13	12	10	0
Fibres (g)	0	0	0	3	0
Na (mg/mmol)	160/7	120/5	50/2	146/6	42/2
K (mg/mmol)	310/8	400/10	131/3	320/8	126/3
P (mg/mmol)	200/6	220/7	1150/34	200/6	48/2
Eau (ml)	160	150	79	75	124
Arômes et Réf. Qualiatic	Café : 410243 Vanille : 410246 Abricot : 407889	Chocolat : 484223 Café : 484225 Fruit des bois : 484226	Fraise : 484491 Vanille : 484492 Cappucino : 484490	Vanille : 484222 Mangue/Pêche : à venir	Orange : 407899 Framb/Cassis : 407901

Recommandations :

- Expliquer le but de la prise des suppléments nutritifs oraux (par ex. cicatrisation, maintien du statut nutritionnel)
- Heures conseillées de consommation : après ou entre les repas / Pas de consommation 2h avant les repas.
- Servir de préférence frais et consommer à l'aide d'une paille
- Sans gluten, traces de lactose

Oral Impact (Nestlé) A commander au magasin via Qualiatic (Art. n°402247)

Nutrition Entérale (NE)

	Novasource® GI forte Nestlé 500 ml	Jevity® Abbott 500ml	Promote® Fibres Plus Abbott 500 ml	Impact® enteral Nestlé 500 ml	Survimed® OPD HN Fresenius Kabi 500 ml	Fresubin® 2 kcal HP Fibre** Fresenius Kabi 500 ml
Energie (kcal)	775	535	655	505	665	1000
Osmolarité (mosm/l)	389	249	305	298	370	395
Protéines (g)	30	20	41	28	34	50
glutamine (g)	7	0	0	5	3	5
arginine (g)	1	0	0	6.5	1	2
Glucides (g)	92	70	71	67	92	83
Lipides (g)	30	17	22	14	19	50
omega-3 (g)	1	0	0	1.7	1	2.3
TCM* (%)	7	20	20	3	10	13 (26%)
Fibres (g)	11	9	8	<5	0.4	7.5
Na (mg/mmol)	600/26	465/20	500/22	535/23	675/30	300/13
K (mg/mmol)	675/18	785/20	650/16	670/17	1300/33	850/22
P (mg/mmol)	375/12	360/12	425/14	360/12	360/12	600/20
Mg (mg/mmol)	150/6	110/5	125/5	115/5	150/6	100/4
Ca (mg/mmol)	400/10	460/12	575/14	400/10	450/11	1025/26
Zn (mg/μmol)	9/138	5.5/84	8.5/130	7.5/115	9/138	12/185
Se (μg/μmol)	50/0.6	27/0.3	43/0.5	24/0.3	50/0.6	67/0.8
Vit C (mg)	80	50	100	34	60	67
Vit K (μg)	55	31	35	34	50	67
Eau (ml)	380	417	397	425	400	355
N°art. magasin	110269	453128	461676	110270	466226	445060

Remarques : sans lactose et sans gluten. Osmolarité < 350 mosmol/L : peu d'influence sur la tolérance digestive si administré selon les bonnes pratiques.

Si des médicaments doivent être passés par la sonde ou la stomie, se référer au site de la pharmacie :

http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/tab_couper_ecraser.pdf

*TCM : triglycérides à chaînes moyennes.

**Uniquement si le patient avait ce produit à domicile.

Nutrition parentérale (NP)

	Omegaflex® special			MedNuTRIflex® Oméga	PeriOlimel® 2.5%		Aminomix® N1	Lipofundin MCT/LCT® 20%		Glucose 20% 40%	
	B. Braun			B. Braun	Baxter		Fresenius Kabi	B. Braun		Bichsel	
Voie veineuse	Centrale			Centrale	Périphérique		Centrale	Périphérique ou centrale		Centrale	
Posologie max. (adulte)	35 ml/kg/j			40 ml/kg/j	40 ml/kg/j		30 ml/kg/j	10 ml/kg/j			
Vitesse de perfusi max. (adulte)	1.7 ml/kg/h			2 ml/kg/h	3 ml/kg/h		1.25 ml/kg/h	0.15 g/kg/h			
Volume (ml)	625	1250	1875	2500	1500	2000	1500	100	250	500	500
Eau (ml)	499	998	1497	2080	1335	1780	1212	86	215	425	375
Energie totale (kcal)	740	1475	2215	2530	1050	1400	1500	194	484	400	800
Energie non prot (kcal)	600	1195	1795	2155	900	1200	1200	194	484	400	800
Osmolarité (mosm/l)	1545	1545	1545	1215	760	760	1779	380	380	1110	2220
Protéines (g)	35	70	105	96	38	51	75	-	-	0	0
Glucides (g)	90	180	270	300	113	150	300	-	-	100	200
Lipides (g)	25	50	75	100	45	60	-	21	52		
	LCT 40%, MCT 50%; Omega-3 10%			LCT 40%, MCT 50%; Omega-3 10%	Soja 20%, Olive 80%		-	LCT 50%, MCT 50%		-	-
Na (mmol)	34	67	101	100	32	42	75				
K (mmol)	24	47	71	70	24	32	45				
PO4 (mmol)	10	20	30	30	13	17	22.5				
Mg (mmol)	3	5	8	8	3	4	4.5				
Ca (mmol)	3	5	8	8	3	4	3				
Cl (mmol)	30	60	90	90	36	48	96				
Acetate (mmol)	30	60	90	90	41	54	112.5				

- MCT : triglycérides à chaînes moyennes ; LCT : triglycérides à chaînes longues
- Procéder au mélange des trois compartiments et à l'ajout des suppléments vitaminés et éléments trace juste avant l'administration.
- Pour les compatibilités « en Y » des médicaments, consulter le site de la pharmacie:
http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/omegaflex_admin_adulte.pdf ou contacter l'Assistance pharmaceutique au 31080.

Nutrition Parentérale (NP) : Supplémentations spécifiques

Addaven® Fresenius Kabi	Composition par ampoule	Cernevit® Baxter AG	Composition par ampoule
<ul style="list-style-type: none"> • Indications : apport systématique en oligo-éléments lors de NP • Contre-indications : obstruction biliaire totale ; 1x/ 72h si insuffisance hépatique • Conditionnement : ampoule 10 ml • Osmolalité : 3100 mosm/kg • Posologie : 1 amp/j • Administration : centrale ou périphérique* 	Fe 20 µmol Zn 77 µmol Cu 6 µmol Mn 1 µmol Iode 1 µmol Se 1 µmol Mo 0.2 µmol Cr 0.2 µmol F 50 µmol	<ul style="list-style-type: none"> • Indications : apport systématique en vitamines hydro et liposolubles lors de NP • Contre-indications : hyperparathyroïdie, insuffisance rénale non dialysée • Conditionnement : ampoule sèche • Osmolarité reconstitué 5ml : 1005 mosm/l • Posologie : 1 amp/j • Administration : centrale ou périphérique * 	C 125 mg A 3500 UI D 220 UI E 11.2 UI B1 3.5 mg B2 4.1 mg B3 46 mg B5 17.25 mg B6 4.5 mg B8 69 µg B9 0.4 mg B12 6 µg

Dipeptiven® Fresenius Kabi	Omegaven® Fresenius Kabi
<ul style="list-style-type: none"> • Indications : absence de substrat digestif (support parentéral total), intestin court, maldigestion et/ ou malabsorption sévère • Contre-indications : insuffisance hépatique, insuffisance rénale non dialysée (clearance < 25 ml/min), acidose sévère, pathologie oncologique • Conditionnement : flacon de 100 ml • Osmolarité : 921 mosm/l • Posologie : 1,5 à 2,5 ml/kg/j • Administration : centrale ou périphérique ajouté à la NP* • Composition : L-Alanyl-L-Glutamine 20g = 13.5g de glutamine • Energie : 80 kcal/100 ml 	<ul style="list-style-type: none"> • Indications : traumatisme – syndrome inflammatoire • Contre-indications : perturbation du métabolisme des lipides, troubles de la coagulation • Conditionnement : flacon de 100 ml • Osmolarité : 273 mosm/l • Posologie : 1 à 2 ml/kg/j • Administration : centrale ou périphérique ajouté à la NP* • Composition : huile de poisson 10 g EPA: 1,25–2,82 g ; DHA : 1,44–3,09 • Energie : 112 kcal/100 ml

*Voir modalité d'administration : http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/omegaflex_admin_adulte.pdf ou Assistance pharmaceutique au 31080