

PROTOCOLE FER IV EN PÉDIATRIE VENOFER ou FERINJECT/FERYXA

<i>Étiquette du patient</i>	Médecin prescripteur : GSM : Signature médecin prescripteur : Médecin de l'unité : GSM : Signature médecin de l'unité : Poids du patient : kg Date d'administration : Heure :
-----------------------------	--

Indication (à définir par le médecin prescripteur) :

Calcul de la dose :

La dose totale de fer à administrer en mg par voie parentérale (correspondant au déficit en fer total (mg)) doit être déterminée individuellement, sur la base du taux d'hémoglobine et du poids corporel de l'enfant, à l'aide de la **formule de Ganzoni** (cf. ci-dessous). La quantité totale peut être divisée en plusieurs doses (cf. dose max par administration et intervalle à respecter selon préparation choisie cf. prescription)

$$\text{Déficit en fer total [mg]} = [\text{poids corporel [kg]} \times (\text{Hb cible}^a - \text{Hb mesurée}) \text{ [g/dL]} \times 2.4^b] + \text{réserves en fer [mg]}^c$$

^a **Hb cible** : si poids <35 kg : 13 g/dL et si poids >35 kg : 15 g/dL

Attention ! Le laboratoire HUG rend ses résultats d'Hb en g/L (ex. 120 g/L = 12.0 g/dL)

^b le **facteur 2.4** correspond à : $0,0034 \times 0,07 \times 10'000$ où :
 0.0034 = teneur en fer de l'Hb = 0,34%
 0.07 = volume sanguin = 7% du poids corporel
 10'000 = conversion des g/dL en mg/L

^c **réserves en fer** : si poids <35 kg : 15 mg/kg et si poids >35 kg : 500mg



Exemple de calcul pour enfant de 26 kg avec Hb à 93 g/L (9.3 g/dL) :

- **Déficit en fer total** = $[26 \text{ kg} \times (13 \text{ g/dL} - 9.3 \text{ g/dL}) \times 2,4] + (15 \text{ mg} \times 26 \text{ kg}) = 620,88 \text{ mg} \rightarrow$ arrondi à **620 mg**
- Choix Venofer car < 40kg
 Dose par prise de Venofer : 7 mg/kg (max 200 mg/dose) $\rightarrow 7 \text{ mg} \times 26 \text{ kg} = 182 \text{ mg}$
 Pour administrer 620 mg on peut donner par exemple :
 3 doses à 180 mg + une 4^{ème} dose de 80 mg, espacées chacune de 48h

Prémédication(s) éventuelle(s) si nécessaire :

- Paracétamol IV sur 10 à 15 min **15 mg/kg** (max 500 mg): mg
- Tavegyl (clémastine) (1 mg/mL) IV lent 3-5 min **0.0125 mg/kg** (max 1 mg) : mg

Prescription :

	<input type="checkbox"/> Venofer (fer saccharose)  Amp. 100mg/5mL (20 mg/mL)	<input type="checkbox"/> Ferinject (fer carboxymaltose) <input type="checkbox"/> Feryxa (fer carboxymaltose)  Flacon 100 mg/2mL et 500 mg/10mL (50 mg/mL)
Indications	Nouveau-né et enfant (enregistré dès 2 ans)	Dès > 40kg ou > 14 ans
Dose max	7 mg/kg 1x jour (max 200 mg/dose) intervalle 48h Si la dose totale cumulée de fer dépasse 7 mg/kg ou 200 mg , la dose totale doit être administrée de manière fractionnée (répartition des doses au libre choix du médecin)	20 mg/kg 1x jour (max 1000 mg/dose) intervalle 7 jours Si la dose totale cumulée de fer dépasse 20 mg/kg ou 1000 mg , la dose totale doit être administrée de manière fractionnée (répartition des doses au libre choix du médecin)
Dose totale pour le traitement (selon calcul déficit) mg au total mg au total
Nombre de doses au total doses espacées de 48h doses espacées de 7 jours
Protocole	Soitmg =mL le .../.../...mg =mL le .../.../...mg =mL le .../.../...	Soitmg =mL le .../.../...mg =mL le .../.../...mg =mL le .../.../...

Administration:

	Venofer (fer saccharose)	Ferinject / Feryxa (fer carboxymaltose)
Dilution	NaCl 0.9% uniquement Conc min : 1 mg/mL	NaCl 0.9% uniquement Conc min : 2 mg/mL Conc. max VVP et VVC: 50 mg/mL
Stabilité	12 heures	12 heures
Perfusion IV	1. Dose test : Administrar 10% du volume de la solution en 10 min 2. Stopper la perfusion et surveiller le patient pdt 30 min 3. Si aucune réaction, perfuser le reste selon : ≤ 100 mg → sur 30 min >100 à ≤ 200 mg → sur 60 min Néonatalogie : perfusion IV sur 2h quelques soit la dose	Perfusion IV sur 15 min à 30 min selon Uptodate
Précautions	pH : 10.5 à 11.0 Osmolarité : 1250 mOsm/L (agressif lors d'extravasation, risque de nécrose, et coloration persistante de la peau)	pH 5 à 7 Osmolalité : 45 mOsm/kg (irritation site injection, coloration persistante de la peau lors d'extravasation)

Surveillances du patient :

AVANT le début de la perfusion	PENDANT la perfusion	APRÈS la perfusion
<ul style="list-style-type: none"> • Noter le numéro du médecin en charge à appeler en cas de besoin • TA • FC • Saturation • Température (en cas d'état fébrile prévenir le médecin en charge du patient) 	<ul style="list-style-type: none"> • TA • FC • Saturation • Observation respiratoire (surveiller l'apparition de signes de détresse respiratoire (dyspnée, bronchospasme, stridor) et cutanée (rash, rougeur, œdème) <p>→ toutes les 15 min pdt la 1^{ère} heure → toutes les 30 min pdt la 2^{ème} heure → puis, 1x par heure si le traitement est bien toléré</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TA • FC • Saturation • Température • Observation respiratoire et cutanée <p>→ à l'arrêt de la perfusion → puis 60 minutes après l'arrêt de la perfusion</p>

En cas de déviation des valeurs de référence (voir tableau ci-après ou autres normes précisées dans la prescription médicale) → ☎ appeler le médecin en charge du patient !

Valeurs de références pour la pédiatrie :

Âge	NN	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans	≥ 14 ans
Poids (kg)	3	5	7	10	12	15	20	25	35	≥ 50
Taille (cm)	50	60	70	75	90	95	110	125	140	≥ 160
Freq.Resp /min	30-53	30-53	30-53	30-53	22-37	20-28	20-28	18-25	18-25	12-20
Freq. Cardiaque /min	100-205	100-180	100-180	100-180	98-140	80-120	80-120	75-118	75-118	60-100
TA systolique (mmHg)	60-76	72-104	72-104	86-106	86-106	89-112	89-112	97-115	102-120	110-131
TA moyenne (mmHg)	48-57	50-62	50-62	49-62	49-62	58-69	58-69	66-72	71-79	73-84
TA diastolique (mmHg)	31-45	37-56	37-56	42-63	42-63	46-72	46-72	57-76	61-80	64-83
Hypotension TA systolique (mmHg)	< 60	< 70	< 70	→ 5th percentile : 70 mmHG + (2x âge en années)					<	< 90

Médicaments en réserve :

A avoir à disposition et à ne préparer qu'en cas de besoin :

- Adrénaline **IM :** **0.01 mg/kg** (max 0.3-0.5 mg) : mg
 - si < 15 kg : utiliser ampoules à 0.1 mg/mL (solution 1:10'000) = 0.1 mL/kg
 - si > 15 kg : utiliser ampoules à 1 mg/mL (solution 1:1'000) = 0.01 mL/kg
- Tavegyl (clémastine) (1 mg/mL) **IV lent 3-5 min** **0.0125 mg/kg** (max 1 mg) : mg

Relevé du protocole par infirmier(s)-ère(s) :

Initiales : Signature :

Références :

Taketomo's. Pediatric and neonatal dosage handbook, 25th edition, 2018-2019 et Uptodate monographie Iron sucrose et Ferric carboxymaltose, online / Mattiello V et al. Diagnosis and management of iron deficiency in children with or without anemia: consensus recommendations of the SPOG Pediatric. Eur J Pediatr 2020;179:527-545 (CF 09.06.23) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32020331/> / Hematology Working Group. Eur J Pediatr 2020 ;179:527-545/ Compendium Suisse des médicaments. <https://compendium.ch> / Normes pédiatriques DFEA, Source : PALS 2020, document du RCP octobre 2021 https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/saup_professionnels/fichiers/taille-glasgow-pals_carte.pdf