



LES VISITES



VISITE JOUR 1

Signature du consentement
Informations médicales
Frottis
Tests complémentaires

VISITES JOURS 8-15-22-29

Informations médicales
Frottis

(Visite Jour 60 - optionnelle)

Informations médicales
Frottis

ETUDE UNITY

Nous vous remercions de votre participation à l'étude UNITY !

OBJECTIF DE L'ÉTUDE

L'objectif de l'étude est d'évaluer l'efficacité et la sécurité d'un traitement contre la variole du singe : le tecovirimat.

Comment ? En comparant les temps de guérisons des patients traités au tecovirimat contre les patients traités avec une substance non active (placebo).

CONDUITE DE L'ÉTUDE

Une fois inclus dans l'étude vous recevez soit le tecovirimat, soit le placebo. Ce traitement est à prendre **pendant 14 jours, 2 fois par jour**.

Vous serez suivis médicalement pendant cette période et vous donnerons RDV à l'hôpital tous les 7 jours pendant un mois pour un bilan clinique et des frottis pour évaluer votre charge virale.

Entre ces visites, le médecin pourra vous appeler pour faire un suivi plus avancé de vos symptômes.



Durée du traitement
14 jours



Fréquence
Toutes les 12h



30 min après un
repas gras

Veillez à manger un repas complet et gras 30 minutes avant de prendre le tecovirimat et prenez chaque dose avec un grand verre d'eau. Le repas doit contenir environ 600 calories et 25 grammes de graisse, comme un cheeseburger avec des frites, du riz avec du poulet frit, des pâtes au fromage, un bagel avec du fromage frais, de l'avocat, du beurre de cacahuète, etc.

Si vous oubliez une prise, vous pouvez prendre le traitement jusqu'à 4h après l'heure prévue. Dépassée cette heure, vous pouvez simplement sauter cette prise et continuer avec la prise suivante sans rien modifier.

EFFETS SECONDAIRES

Les gélules de tecovirimat ont été testées chez des adultes en bonne santé ainsi que chez des personnes atteintes de la variole du singe. Aucun problème grave n'a été reporté, néanmoins le tecovirimat peut provoquer certains effets indésirables bénins. Les plus fréquents sont : des maux de têtes, des nausées, des vomissements ou des douleurs d'estomac.

Comme avec tout médicament, il existe un risque potentiel de réaction allergique qui peut se manifester par: une éruption cutanée, une difficulté à respirer, une respiration sifflante, une chute soudaine de tension artérielle, un gonflement, un pouls rapide ou des sueurs.

En cas de question ou problème, veuillez contacter l'équipe de recherche:

EQUIPE DE RECHERCHE
UNITE VIH
079 553 35 76
RECHERCHE-VIH@HCUGE.CH