

Prévenir CdC flux si :

- Déformation visible
- Signes d'atteinte neurologique
- Signes d'atteinte vasculaire
- Fracture ouverte

Traumatisme d'un Membre :

- Contrôle ortho : pouls radial/pédieux, perfusion/sensibilité/mobilité doigt-main/pied-orteil, fourmillements
- Immobilisation :
 - Membre supérieur : avec attelle SamSplint
 - Membre inférieur : attelle mousse ou coussin
- Installation sur un brancard (si possible après avoir pesé l'enfant)
- Antalgie selon le protocole de "[Prise en Charge de la douleur aiguë en traumatologie osseuse](#)"
- Glace (si bien supporté par le patient)
- Emla (attention à ne pas mettre sur le membre traumatisé)
- Garder à jeun (prévenir l'enfant et les parents)
- Noter observation ET traitements sur la feuille de tri informatisée
- Prévenir le CdC flux dans les 10 min
- Évaluer la douleur 15 à 20 min après l'antalgie

Si suspicion ou traumatisme du rachis :

- **Transfert : Immobilisation de la nuque avec minerve (et maintien)**
 - Si l'enfant pèse > 30 kg → avec pelle sur le MacIntosh
 - Si l'enfant pèse < 30 kg → possibilité d'utiliser un drap
- Maintenir à plat et au lit strict (sans oreiller)
- Contrôles neurologiques (sensibilité/mobilité/force main/pied, fourmillement)
- **Antalgie selon le protocole de "[Prise en Charge de la douleur aiguë en traumatologie osseuse](#)"**
- Noter observation ET traitements sur la feuille de tri informatisée
- Prévenir l'interne dans les 10 min
- Évaluer la douleur 15 à 20 min après l'antalgie

Traitement antalgique si douleur > 5

Tramal per os (tramadol)

- Ne pas donner si TC / confusion
- S'assurer que l'enfant n'a pas d'allergie
- Si enfant moins de 2 ans, voir avec interne
- Installer l'enfant sur un chariot ou sur une chaise roulante (risque d'hypotension)

Tramal : 1 gtt = 2,5 mg → dose : 2mg/kg
(enfants de plus de 2 ans)

10 kg : 10 gtt
15 kg : 12 gtt
20 kg : 16 gtt
25 à 50 kg : 20 gtt
> 50 kg : 40 gtt

Sintanyl intra-nasal (Fentanyl)

- Ne pas donner si trauma nasal – altération de la conscience
- S'assurer que l'enfant n'a pas d'allergie
- Installer l'enfant sur un chariot
- Satu en continu
- Utiliser les embouts intra-nasals

Dose Fentanyl (Sintanyl®) intra nasal			
âge	Poids	Fentanyl ml	Fentanyl mcg
		50 mcg/ml	1 mcg/kg
1 an	10 kg	0.2	10 mcg
2 ans	12 kg	0.3	12 mcg
3 ans	15 kg	0.3	15 mcg
5 ans	20 kg	0.4	20 mcg
7 ans	25 kg	0.5	25 mcg
10 ans	35 kg	0.7	35 mcg
14 ans	50 kg	1	50 mcg